

‘मल्लिंग’ने करा भुईमुगाची लागवड

कविता पानसरे
पल्लवी पाटील
के.डी.एस.पी. कॉलेज ऑफ
अॅग्रीकल्चर, नाशिक



भुईमूग हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे गळीत धान्य पीक. भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये भुईमुगाची लागवड केली जाते. तसं पाहायला गेलं तर भारतात भुईमुगाची लागवड पारंपरिक पद्धतीनेच केली जाते. पण भारतात तसेच महाराष्ट्रात मल्लिंगने भुईमूग लागवड कशी करता येईल यावर संशोधन करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाबाबत माहिती घेऊया.



तसे भुईमुगाचे पीक तिन्ही हंगामात घेतले जाते. खरीप हंगामात भुईमुगाची पेरणी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केली जाते. भुईमुगाची रब्बी पेरणी नोव्हेंबर महिन्यात करतात. तसेच उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी यादरम्यान केली जाते. महत्वाची बाब म्हणजे उन्हाळी भुईमुगाचे उत्पादन हे खरिपातील भुईमुगापेक्षा दुप्पट येते.

जमीन : भुईमूग लागवडीसाठी मऊ, भुसभुशीत, वाळूमिश्रित, सेंद्रिय पदार्थ असलेली हलकी ते मध्यम जमीन चांगली असते.



पेरणीची वेळ : चांगल्या उगवणीसाठी १९ डि.से. पेक्षा जास्त तापमान योग्य असते. जास्त थंडीच्या वातावरणात पेरणी करू नये. २१ अंश ते ३० अंश उष्ण तापमान असल्यास भुईमुगाची वाढ चांगली होते.

अंतर : निमपसरी जात ९ बाय १८ इंच किंवा ९ बाय १२ इंच तर उपटी जातीसाठी ९ बाय १२ इंच किंवा ६ बाय १२ इंच असे अंतर ठेवावे.

बीजप्रक्रिया : पेरणीपूर्वी एक किलो बियाण्यास थायरम २-३ ग्रॅम किंवा कार्बन्डेझिम ३ ग्रॅम चोळावे. त्यामुळे उगवण चांगली होऊन बुरशीजन्य रोगास प्रतिकार क्षमता वाढते.

जिवाणू संवर्धक : पेरणी पूर्वी बियाण्यास जिवाणू संवर्धक लावल्यास उत्पादनात हमखास वाढ होते, त्यासाठी २० किलो बियाण्यास ५०० ग्रॅम रायझोबिन जिवाणू संवर्धक चोळावे.

लागवडीची पद्धत : भुईमुगाची पेरणी टोकण पद्धतीने करावी, प्रत्येक टोकणीस १ किंवा २ बियाणे टाकावे. रुंद वरंबा व सारी पद्धतीने भुईमुगाची लागवड केल्यास उत्पादन

वाढते.

पॉलिथिन मल्लिंग तंत्रज्ञान : या तंत्रज्ञानाने शेती करण्यासाठी साधारण ७ मायक्रॉन जाडीचे पारदर्शक पॉलिथिन वापरावे. तज्ज्ञांच्या संशोधनानुसार भुईमूग लागवडीसाठी ७ ते २० मायक्रॉन दरम्यानचे मल्लिंग वापरले जाऊ शकते. भौगोलिक परिस्थिती आणि वातावरणीय स्थिती याप्रमाणे वापरण्यात येणाऱ्या मल्लिंग पेपरची जाडी निश्चित केली जाऊ शकते.

सर्वसाधारण एक एकर क्षेत्रासाठी ५ रोलची आवश्यकता भासते. एका रोलमध्ये ६ किलो इतका कागद असतो. कागदाची जाडी ७ मायक्रॉन एवढीच असल्याने त्यातून आल्या सहजपणे खाली जातात. पॉलिथिन कागदामुळे जमीन झाकली जाते व बाहेरील गवताचे बियाणे जमिनीवर पडण्यास अटकाव होऊन गवताची वाढ जवळपास २६ टक्क्यांनी कमी होते. त्याचबरोबर जमिनीचे तापमान वाढण्यास मदत होते परिणामी पेरणीच्या वेळी जमिनीचे तापमान कमी असले तरी बियाण्यांची उगवण चांगली व ३ ते ४ दिवस लवकर होते.

कागद अंतरणे व पेरणी : वरील प्रकारच्या कागदाची रुंदी ९० सें.मी. असते व त्यावरती बियांची टोकण करण्यासाठी ४ सें.मी. साधारण १ इंच व्यासाची छिद्रे पाडावीत. स्प्रींकलर सेटच्या साह्याने जमीन किंचित ओली करून वाफ्यावरती कागद अंधरावा आणि दोन्ही बाजूस मातीत खोचून घट्ट बसवावा. कागदास छिद्रे नसल्याने लोखंडी/पी.व्ही.सी पाईपने ४ सें.मी. व्यासाची छिद्रे पाडावीत. निवड केलेल्या उन्हाळी भुईमूग बियाण्याची पेरणी करावी. दोन छिद्रांमधील अंतर १५ ते २० सें.मी. तर दोन ओळीत अंतर साधारण २० ते ३० सें.मी. ठेवल्यास रोपांची वाढ चांगल्या पद्धतीने होते.

पॉलिमल्लिंगच्या सहाय्याने भुईमूग शेती केल्यास दाण्याचा आकार वाढतो त्याचप्रमाणे उत्पादनात ५० टक्क्यांनी वाढ होते ही गोष्ट शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्वाची आहे.

पाणी नियोजन : पिकाच्या गरजेनुसार किंवा जमिनीच्या प्रतीनुसार पाणी द्यावे. पीक फुलोऱ्यावर येण्याच्या वेळी (पेरणीनंतर २५-३० दिवसांनी), आव्या सुटण्याच्या वेळी आणि शेंगा भरतेवेळी या पिकास पाणी देणे अत्यावश्यक असते.