

तुरीवरील

खोडकुजव्या- पायकुजव्या रोग



पी.बी. खैरे

(मो.नं. ९६६५३०४४६७)
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ,
राहुरी, जि. अहमदनगर

तुरीच्या पिकावरील खोडकुजव्या/ फायटोफथोरा ब्लाईट (रोगकारक बुरशी : फायटोफथोरा ड्रेचस्लेरा) यांचा प्रादुर्भाव अत्यंत विनाशकारी असून, १ ते ७ आठवडे वाढलेल्या पिकामध्ये जास्त नुकसान होते. या रोगामुळे कमी कालावधीच्या पिकाच्या वाणामध्ये याचा प्रादुर्भाव जास्त आढळतो. सतत बरेच दिवस रिमझिम पडणाऱ्या पावसामुळे या रोगाचा प्रादुर्भाव लवकर होतो.

लक्षणे : पिकाच्या लहान रोपांवर फायटोफथोरा बुरशीमुळे रोपे कोलमडणे व मरणे सुरु होते. जमिनीलगत असलेल्या भागावर ही लक्षणे आढळतात. या रोगाचा परिणाम जमिनीखालील खोड व मुळे यावर होत नाही व जरी झाला तरी तो फारसा नसतो. जमिनीपासून वरच्या खोडाच्या १० ते २० सें.मी. उंच भागावर तपकिरी व कालांतराने काळे चट्टे पडतात. अगोदर ते उथळ असतात व कालांतराने ते आत दाबल्यासारखे होतात. असेच चट्टे फांद्यांवरही दिसतात.

रोगाचा प्रसार : मागील वर्षीच्या पिकाच्या शेतात राहिलेल्या रोगग्रस्त झाडांचे अवशेष (धसकटे) व



रोगग्रस्त माती यामुळे रोगप्रसार होतो.

व्यवस्थापन : रोगग्रस्त झाडांचा समूळ नायनाट करावा. पिकामध्ये जास्त पाणी साचू देऊ नये. पेरणी करताना रोगप्रतिकारशक्ती असलेले बियाणे घ्यावे.

पायकुजव्या हा रोग स्कलेरोशियम रोलफसाय या रोगकारक बुरशीमुळे होतो.

लक्षणे : या

रोगाची लागण पीक रोपावस्थेत असतानाच होते. पिकाचा जमिनीजवळील भाग हळूहळू कुजतो व कालांतराने झाडाच्या पानांना पाण्याचा



पुरवठा न झाल्याने व बुरशीची लागण झाल्यामुळे ती पिवळी पडतात. या परिणामामुळे रोपे तग सोडून देतात, कोलमडून खाली पडतात आणि अकाली मरतात. जिथून झाड कुजायला सुरुवात झालेली असते त्या जागेवर पांढरीशुभ्र कापसासारखी बुरशी वाढते व नंतर तिची वाढ झाल्यावर ती मोहरीसारखी दिसते. शेतात आवाक्यापेक्षा जास्त पाणी सोडले असता या रोगाची वाढ झपाट्याने होते व पिकाचे नुकसान होते.

व्यवस्थापन : रोप अवस्थेत रोगाची लागण झाल्यास रोगग्रस्त रोपे काढून टाकावी व त्यांचा नायनाट करावा. (ती जाळून टाकावीत) ट्रायकोडर्मा या जैविक बुरशीनाशकाचा ४ ग्रॅम प्रतिकिलो असा पेरणीपूर्वी बीजसंस्कार करावा.